

MAREOS Y VISIÓN BORROSA POR FUROSEMIDA

Mateos Lardiés, AM,
Mateos Lardiés, MT

Mujer, 77 años

Solicita la toma de tensión arterial

Refiere visión doble y mareos que achaca al tramadol. Está pensando dejarlo pero presenta dolores.

Tratamiento farmacológico

- Furosemida 40 mg: 2-0-0
- Espironolactona 25 mg: 0-2-0
- Losartan 50mg: 1-0-0
- Baclofeno 10mg: 1-1-1
- Metamizol magnésico 575 mg: 1-1-1
- Tramadol retard 50 mg: 1-0-1
- Omeprazol 20 mg: 1-0-0
- Simvastatina 20 mg: 0-0-1
- Lormetazepam 1 mg: 0-0-1

MAFC según protocolo IMPACHTA: TAS/TAD/FC: 150/90/72 (mmHg/mmHg/lpm).

¿Cambio del tratamiento en los últimos días?

¿Toma algún medicamento no sujeto a prescripción, complemento alimenticio o producto a base de plantas?

Desde hace 4 días:

MAP: ↑ de furosemida de 1 a 2 cp diarios

Paciente: Añade 1 seguril® por la mañana (que tenía en domicilio)

Suprimido ingesta de sal

No toma ningún otro medicamento ni complemento

Intervención

Se le explica a la paciente que **no debe volver a tomar el seguril®** sin consultar con el médico o farmacéutico

La aparición de visión borrosa y mareos puede ser debido al **aumento de dosis de furosemida (se ha triplicado)**. Una elevada dosis de furosemida asociada a una disminución de la ingesta de sodio con la alimentación pueden incrementar estos efectos.

Los efectos adversos de la furosemida son **dosis-dependientes**. Entre las reacciones adversas de la furosemida se incluyen mareos, vértigo, visión borrosa

Se procede a escribir **un informe al médico** que se hace llegar a través del paciente.

Resultado

La paciente regresa a la farmacia al cabo de una semana informando de la reducción, por parte del médico, de la dosis de furosemida a 1 comprimido de 40 mg al día. Dice encontrarse bien y haber remitido los mareos y problemas Oftalmológicos

Conclusiones

El farmacéutico comunitario por sus conocimientos, profesionalidad y accesibilidad puede contribuir a resolver los problemas relacionados con el tratamiento.