

SEGUIMIENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN UNA PACIENTE

Ana Cueto Jiménez, Damià Barris Blundell, María Isabel Compañía Ariza
Farmacia Zarzuelo - Benalmádena (Málaga)



INTRODUCCIÓN

Mujer de 79 años que acude a la farmacia y refiere estar padeciendo irritación, enrojecimiento y dolor agudo intermitente en ambos ojos. La paciente sufre de glaucoma y tiene su tratamiento, además de tomar otros medicamentos. Sospecha que se deba a un medicamento en colirio para tratar su glaucoma, así que ha dejado de usarlo.

INTERVENCIÓN

Le ofrecemos el servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico al que accede. Además, se le realiza un seguimiento de los valores de la Presión Intraocular (PIO).

La paciente está en tratamiento con Bimatoprost/timolol, Levotiroxina 100 mcg, calcio carbonato/colecalciferol y ácido alendrónico 70 mg.

Estudiamos el tratamiento con Ganfort® (timolol + bimatoprost) y encontramos como efectos adversos muy frecuentes: queratitis, erosión corneal, sensación de ardor, prurito ocular, sensación de escozor, dolor ocular, alteración de la visión... efectos similares a los nombrados por la paciente.

El punto de partida del episodio de seguimiento es el siguiente:

Clasificación del RNM	Situación del PS	Medicamento implicado	Identificación del PRM	Qué se pretende hacer para resolver el problema
Inseguridad no cuantitativa	Problema manifestado	Timolol + bimatoprost	Probabilidad de efectos adversos	Intervenir sobre la estrategia farmacológica (retirar medicación y sustituir)

El objetivo pactado con la paciente se orienta hacia la eliminación de la sospecha del efecto adverso causado por el colirio de timolol y bimatoprost. Aprovechamos para realizar mediciones periódicas de la PIO para proporcionar al médico mayor información de la situación de la paciente.

Derivamos al médico con un informe sobre la relación entre el medicamento para el control de la PIO y las reacciones adversas oculares (figura 1).

RESULTADOS

Tras la retirada del colirio de Timolol y Bimatoprost las fuertes molestias oculares han desaparecido. Este hecho nos ayuda a confirmar nuestra sospecha de reacción adversa por lo que procedemos a redactar una tarjeta amarilla para su notificación al Centro Andaluz de Farmacovigilancia.

Su médico especialista retira Ganfort® (timolol + bimatoprost) y prescribe Saflutan® (tafluprost). Ante este cambio estamos pendientes de que no se repitan posibles efectos adversos oculares, pues el nuevo medicamento prescrito también contiene un análogo de la prostaglandina (tafluprost).

Seguimos realizando el seguimiento de la PIO con el nuevo tratamiento, pero los valores de PIO siguen siendo altos (figura 2). Estos nuevos valores son remitidos al médico especialista a través de la paciente, el cual considera cambiar de nuevo el tratamiento y le prescribe Tabtiqom® (tafluprost y timolol), consiste en añadir a su tratamiento actual timolol. Con este cambio se alcanza un control óptimo de la PIO.

FARMACIA C. ZARZUELO
C/. Ciudad de Melilla, 20-21 • 29631 Benalmádena (Málaga) • Tel. 952 56 30 67 • www.farmaciazarzuelo.com

DEL FARMACÉUTICO/A: M ^ª Isabel Compañía Ariza	NOMBRE PACIENTE
A: Médico especialista (oftalmólogo)	Nº SS:

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN

Estimado Dr(a),

Le remito a la paciente que ha acudido a la farmacia refiriendo que padece de irritación, escozor, enrojecimiento y dolor en ambos ojos desde hace un tiempo. Debido a esto, ha dejado de usar Ganfort en colirio. Los valores de PIO han alcanzado valores de 39 mmHg en el ojo izquierdo y de 40 en el ojo derecho. Tras haber hablado con la paciente y revisado su medicación, sospechamos que el tratamiento con Ganfort en colirio podría ser la causa de tales efectos adversos.
Por favor, valore según su criterio.

Muchas gracias.

Firmado: M^ª Isabel Compañía Ariza

Observaciones al Farmacéutico/a:

En Benalmádena a..... de 200.....
Firma

0241

Figura 1. Informe para el médico




Figura 2. Seguimiento de los valores de PIO

CONCLUSIONES

Durante la dispensación se ha detectado un posible PRM, por lo que se le ofreció el servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico acompañado del servicio de seguimiento de la PIO desde la propia farmacia. De esta forma, se realiza un estudio de su medicación y se detectan valores muy altos de la PIO.

Podemos determinar que los síntomas que sufre se deben a un medicamento, esto permite realizar una tarjeta amarilla y una derivación documentada al médico especialista.