

COBERTURA, OPINIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS ESPAÑOLES FRENTE A LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

Vicente Javier Baixauli Fernández¹, Mónica Alacreu García², María Teresa Climent Catalá³, Luis Salar Ibañez⁴, Rosa Prats Más⁵, Cristina Aparicio Cercós⁴.

- 1 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Mislata.
2 Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
3 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en L'Olleria.
4 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Valencia.
5 Sociedad Española de farmacia familiar y comunitaria. Farmacia comunitaria en Denia.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la gripe es la enfermedad inmunoprevenible más habitual en los países desarrollados. Su gran impacto social la convierte en un auténtico problema de salud pública. La medida de control considerada más eficaz y recomendada por todas las organizaciones e instituciones nacionales y supranacionales es la vacunación anual de los grupos de población con el riesgo más alto de padecer complicaciones asociadas a ésta¹. En España, la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario privado de interés público que lleva a cabo mayoritariamente la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. En las 22.071 farmacias españolas trabajan 51.959 farmacéuticos comunitarios (FC) (2,35 FC/farmacia)², sin contar al personal técnico auxiliar y al resto de trabajadores sanitarios³. Se estima que atienden diariamente a más de 2,3 millones de personas⁴ siendo a menudo, por su accesibilidad y cobertura, la puerta de entrada a la AP del sistema sanitario. Las personas que acuden a las farmacias solicitando la dispensación de algún medicamento, y en particular, la indicación de un tratamiento sintomático para la gripe, pueden ser portadores del virus, y transmitirla, tanto a otras personas con las que allí coincidan, como a su personal, que a su vez, puede transmitirla a la población con un alto riesgo de sufrir complicaciones por ésta. Por esta razón, está recomendada la vacunación contra la gripe en el personal de la farmacia⁵. Sin embargo, se desconoce tanto el efecto de la gripe sobre el absentismo laboral de los FC, como la cobertura vacunal contra la gripe de éstos así como las causas que les llevan tanto a vacunarse como a no hacerlo, ya que los datos publicados sobre cobertura vacunal entre el personal sanitario no incluyen a los FC, ni al personal sanitario de las farmacias. Tampoco se conoce el absentismo que la gripe provoca entre ellos, su disposición a recomendar la vacunación antigripal a la población y su administración en la farmacia comunitaria.

OBJETIVOS

- Estimar la tasa de vacunación antigripal entre los farmacéuticos comunitarios españoles de las tres últimas campañas antigripales (2016 a 2018).
- Describir las causas que refieren para vacunarse o no de la gripe
- Estimar el absentismo laboral provocado por la gripe
- Conocer la disposición de los FC a recomendar la vacunación antigripal (VCG) a la población y a realizar su administración en la farmacia.


MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo mediante encuesta online a FC entre febrero y marzo 2019. La población fue 15.301 FC registrados en Campus SEFAC. Se recogieron variables sociodemográficas y sobre la VCG. El análisis estadístico se realizó con el software estadístico R. El estudio contó con el informe favorable del Comité de Ética para la Investigación Biomédica de la Universidad CEU Cardenal Herrera.



RESULTADOS

La tasa de respuesta fue del 9,4% (1.436 FC). Las cifras de vacunación fueron: 30,7% en 2016-2017, 29,5% en 2017-2018 y 33,4% -31-35,8% (IC95%) en 2018-2019. Existe relación significativa entre vacunarse en la última campaña y haberse vacunado en alguna de las campañas anteriores ($p < 0,05$). Estar asociado a SEFAC, ser titular/cotitular, la experiencia profesional, la edad, vacunarse para evitar la gripe y/o por responsabilidad y vacunarse en campañas anteriores son factores asociados significativamente a vacunarse ($p < 0,05$). Las tres causas más frecuentes para vacunarse son: la autoprotección frente a la gripe, no hacer daño al paciente y la ejemplaridad. Para no vacunarse son: olvido, falta de comodidad y no recibir la recomendación. El absentismo por gripe en la campaña antigripal 2018-2019 fue del 9,5%. Un 93,6% de los FC recomienda la VCG a los grupos de riesgo y un 82% estaría dispuesto a administrarla en la farmacia si se autorizase.

FC vacunados contra la gripe en las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.



Absentismo laboral por gripe entre fc en 2018-2019



CONCLUSIÓN

La cobertura vacunal contra la gripe entre los FC es baja en sintonía con el resto de profesionales sanitarios del SNS. El conocimiento de las causas para vacunarse y no vacunarse también aporta datos útiles para diseñar acciones de sensibilización específicas que incrementen directamente la cobertura vacunal en este colectivo e indirectamente en la población a la que atienden. La gripe causa un absentismo relevante entre los FC y facilitarles la vacunación contra la gripe tal y como se efectúa en centros sanitarios y algunas empresas podría incrementar su cobertura. Los FC estarían dispuestos a administrar la vacunación contra la gripe en farmacias autorizadas y a recomendarla entre la población.

PALABRAS CLAVE

farmacia comunitaria; gripe humana; cobertura de vacunación

BIBLIOGRAFÍA

- Gripe e impacto de la vacuna antigripal. Temporada 2018-2019. Sistema de vigilancia de la gripe en España. Centro nacional de epidemiología. [Acceso 29/08/2019]. Disponible en: <http://vgripe.isciii.es/inicio.do>
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2018. Madrid: CGCOF; 2019. [Acceso 29/08/2019]. Disponible en: <https://statics-correofarmaceutico.uecdn.es/cms/sites/11/2019/06/Estadisticas-de-Colegiados-y-Farmacias-2018.pdf>
- Grupo de trabajo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en trabajadores sanitarios. Madrid: Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017. [Acceso 6/09/2019]. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_sanitarios.pdf
- Agenda-Social y sanitaria de la farmacia. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2019. [Acceso 24/08/2019]. Disponible en: <https://www.portalfarma.com/Profesionales/organizacioncolegial/agenda-social-sanitaria-farmacia/Documents/2019-Agenda-Social-Dossier-CGCOF.pdf>
- Comisión de Salud pública. Recomendaciones de vacunación frente a la gripe. Temporada 2018-2019. 20 de septiembre de 2018. Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. [Acceso 24/08/2019]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacion_Gripe.htm