

IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN UNA OFICINA DE FARMACIA

Jose María Zarauz Céspedes 1
1 Farmacéutico comunitario. (UCAM)

OBJETIVOS:

Conocer la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes o dislipemia) en los pacientes que acuden a la oficina de farmacia, que se podrían beneficiar de la implantación de un servicio de Atención Farmacéutica (AF).

RESULTADOS:

Un 34,62% de los pacientes presentó alguna de las tres patologías asociadas al riesgo cardiovascular, el 65,38% restante no presentó ninguna de ellas. El 23,53% eran hipertensos, 6,94% diabéticos y 15,33% dislipémicos.

No se observaron diferencias significativas respecto al sexo, sin embargo si se observan diferencias significativas en función de los diferentes grupos de edad.

El 56% de los pacientes mayores de 65 años sufre alguna de las tres patologías.

CONCLUSIONES:

La implantación de un servicio de Atención Farmacéutica para pacientes hipertensos, diabéticos y dislipémicos mejoraría el control de estas patologías y contribuiría a una mayor calidad de vida.

REFERENCIAS:

Sabater D, Milena M, Faus MJ, "Método DÁDER. Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico"
Univ. de Granada. Tercera Edición 2007.

Machuca M, Parras M, Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre hipertensión. Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Univ. de Granada. 2003.

MÉTODO:

Estudio transversal descriptivo de las dispensaciones de medicamentos incluidos en los grupos terapéuticos A10 (antidiabéticos), C02 (antihipertensivos) y C10 (hipolipemiantes) realizadas con prescripción médica. La población de estudio incluye a todo paciente que entra en la OF con una prescripción médica, durante un periodo de un mes, en una farmacia situada en Águilas (Murcia). El número de pacientes registrados fue de 1037. Se registró el tipo de paciente por patología como variable dependiente, y la edad y el sexo como variables independientes.



Figura 1: Porcentaje de pacientes mayores de 65 con algún factor de RCV

PALABRAS CLAVE:

Prevención; cardiovascular; farmacia