

Consulta de indicación farmacéutica sobre eczemas. Criterios de derivación

Nº 513

IVALOR
ECZEMAS

Vega Calzada C¹, Prats Mas R¹, Eyaralar Riera T¹, Salar Ibáñez L¹

¹Farmacéutico/a comunitario/a.

Palabras clave: servicios comunitarios de farmacia; protocolos clínicos; eczema

Objetivos

Estudiar la demanda de Indicación Farmacéutica relacionada con eczemas.

Metodología

Se consensúan 10 Criterios de Derivación (CD) con SEMERGEN: situaciones en las que el farmacéutico debe derivar al médico para valoración, aunque se acepta que en algunos casos no se derive al paciente, y/o que el paciente rechace dicha derivación. Los casos se registran en una web habilitada al efecto. Si se produce la derivación se entrega al paciente un informe para el médico.

Resultados

✓ 228 farmacéuticos recogieron 1.132 casos de consultas por eczema, 58,3% mujeres. El rango de edad fue de 0 a 99 años, siendo la mediana 40 y el promedio 38,8 años (DE 24,1) 39,3 mujeres, 40,4 hombres. El grupo de edad más representado fue de 25 a 50 años con el 39,8 % de los casos.

✓ 682 (60,2%) pacientes presentaban al menos un CD (total 972 CD) siendo 67 los que presentaban más de 2. No hay diferencias en el número de CD en función de la edad o el sexo.

✓ Todos los pacientes con CD eran susceptibles de ser derivados al médico, pero el farmacéutico decidió no derivar a 61 (8,9%). No hubo diferencias significativas en cuanto a sexo. En cuanto a la edad, si dividimos la muestra en dos grupos por la mediana, hay más tendencia a no derivar a los "jóvenes" que a los "viejos" 10,6% frente a 7,4% pero no es significativo (p=0,135)

✓ De los 621 a los que se les propuso la derivación 117 (18,8%) no la aceptaron. Las mujeres se negaron más que los hombres (21,7% frente a 15,2% p=0,041)

✓ EL CD más frecuente fue "Sospecha de lesión cutánea sin diagnóstico" con un 21,1% de los pacientes, seguido de "Extensión de las lesiones" 12,6%.


✓ El CD que menos se derivó al médico fue "Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos" se derivó al 83,2% de los que lo presentaban. Y el que más "Sospecha de sobreinfección" se derivó al 98,0%

✓ El CD que más se rechazó la derivación fue "Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos" (30,4%) y el que menos "Eczematización de úlceras venosas crónicas" (93,5%).


Discusión

El número de casos con CD no es creíble, 60% de pacientes es claramente excesivo. Suponemos un importante sesgo de registro, se registra más aquello que interesa. La proporción entre los diferentes CD y los resultados obtenidos consideramos que sí puede reflejar la realidad.

Intención de derivar (n=682)



Acepta derivación (n=621)



Distribución de Criterios de Derivación y porcentajes calculados sobre total de CD y total de pacientes

Descripción Criterio de Derivación (CD)	n	% sobre CD	% sobre pacientes
Sospecha de lesión cutánea sin diagnóstico	239	24,6%	21,1%
Lesión cutánea grave	58	6,0%	5,1%
Extensión de las lesiones	143	14,7%	12,6%
No hay mejoría tras el tratamiento o existe empeoramiento clínico	131	13,5%	11,6%
Sospecha de reacción adversa al medicamento	43	4,4%	3,8%
Sospecha de sobreinfección	101	10,4%	8,9%
Paciente con enfermedad sistémica concomitante	30	3,1%	2,7%
Dudas diagnósticas	101	10,4%	8,9%
Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos	95	9,8%	8,4%
Eczematización de úlceras venosas crónicas	31	3,2%	2,7%
Total CD	972	100,0%	
Total pacientes	1.132		

Intención de derivar del farmacéutico y aceptación de la derivación por el paciente, según el Criterio de Derivación presente

Descripción Criterio de Derivación (CD)	Intención de derivar		Acepta derivación					
	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No
Sospecha de lesión cutánea sin diagnóstico	34	205	14%	86%	163	42	79,5%	20,5%
Lesión cutánea grave	2	56	3%	97%	52	4	92,9%	7,1%
Extensión de las lesiones	3	140	2%	98%	116	24	82,9%	17,1%
No hay mejoría tras el tratamiento o existe empeoramiento clínico	5	126	4%	96%	107	19	84,9%	15,1%
Sospecha de reacción adversa al medicamento	1	42	2%	98%	35	7	83,3%	16,7%
Sospecha de sobreinfección	2	99	2%	98%	90	9	90,9%	9,1%
Paciente con enfermedad sistémica concomitante	1	29	3%	97%	27	2	93,1%	6,9%
Dudas diagnósticas	7	94	7%	93%	78	16	83,0%	17,0%
Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos	16	79	17%	83%	55	24	69,6%	30,4%
Eczematización de úlceras venosas crónicas	0	31	0%	100%	29	2	93,5%	6,5%
Total CD	71	901	7%	93%	752	149	83,5%	16,5%