MADRID2022
Conectados al paciente
X CONGRESO NACIONAL
DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
5-7 MAYO
Centro de Convenciones Norte IFEMA

Uso de semaglutida inyectable para indicación fuera de ficha técnica. Caso clínico.

Clara Frau Bonafè; Sira Rosa Flaquer Serrano

Introducción

Llega a nuestra farmacia una prescripción de semaglutida 1 mg inyectable como inicio de tratamiento. Preguntamos si es para diabetes y el paciente refiere que es para adelgazar. Está pautada por endocrinólogo. Nos explica que las primeras semanas debe ponerse 17 clics y luego ir aumentando.

Evaluación

Comprobamos en ficha técnica la indicación autorizada por la AEMPS: tratamiento de DM2, que no han sido controlados adecuadamente , como complemente a dieta y ejercicio en monoterapia o añadida a otros medicamentos para la diabetes.

Revisamos en ficha técnica las dosis y nos aparecen en milígramos, nunca en clics. En el prospecto pide que no se cuenten los clics de la pluma.

Intervención

Desconocemos esta indicación y la medida de los clics no está contemplada en la ficha técnica. Pedimos al paciente que revise la pauta con el especialista y vuelva a la farmacia. En FC revisamos la bibliografía de la Aemps y la FDA y consultamos internet.

Seguimiento

El paciente vuelve con la hoja pautada del especialista y en ella están anotados los clics descritos así:

Dosis semanal :

-17 clicks = 0.25 mg (hasta la cuarta semana)

- **34 clicks = 0.50 mg (en función de la respuesta)**
- **51 clicks = 0.75 mg**
- **Tope : 1 mg**

Nosotros por nuestra parte observamos diferentes contenidos en redes sociales y en blogs de diversas descripciones sobre las dosis de semaglutida inyectable y su equivalente en clics.

Conclusiones

En Estados Unidos, la FDA sí tiene aprobada como indicación de la semaglutida inyectable el tratamiento de la obesidad pero con las dosis en milígramos.

La posología en función de los clics induce a mayor margen de error y riesgo.

En ficha técnica se definen 6 semanas de caducidad desde la apertura de la pluma. Con el sistema de clics se estaría utlilizando durante más semanas.

En cada administración se debe cambiar la aguja y en la caja del medicamento solo constan 4 agujas (que es la destinada para la pauta de DM2 anteriormente mencionada).

Recomendamos una revisión de esta indicación fuera de ficha técnica y poner en conocimiento a los farmacéuticos comunitarios sobre este uso.