MADRID2022
Conectados al paciente

X CONGRESO NACIONAL
DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
5-7 MAYO
Centro de Convenciones Norte IFEMA

DETECCIÓN DE REACCIÓN ADVERSA A DAPAGLIFLOZINA EN UNA DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA

INTRODUCCIÓN

forxiga
(dapagliflozin)

Mujer de 65 años, casada, ama de casa. Vive acompañada de su marido.
Fumadora de 4 cigarrillos al día.
Habitual de la oficina de farmacia.

TRATAMIENTO

Diagnosticada de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) desde hace 4 años. Desde entonces toma metformina 850mg (1-0-1).

Hace 15 días el endocrino le prescribe dapagliflozina 10mg (1-0-0) junto con la metformina que ya tomaba, debido a que en sus últimos análisis, el valor de glucosa es 175mg/dl y su hemoglobina glicosilada es 7,5%.

Se dispensa la nueva medicación indicándole pautas de higiene íntima para evitar posibles reacciones adversas. Es posible la excreción de glucosa y el aumento de la diuresis.

Al mes siguiente, la paciente acude a la farmacia para retirar su medicación y refiere que lleva días con problemas vaginales, que pueden parecer hongos. Se encuentra muy afectada y apenas realiza sus tareas cotidianas.

EVALUACIÓN

RAM

Se detecta una posible reacción adversa del medicamento (RAM).

Dapagliflozina
Mecanismo de acción: La inhibición del SGLT2 reduce la reabsorción de glucosa, del filtrado glomerular en el túbulo proximal renal con una reducción concomitante de la reabsorción de sodio que conduce a la excreción urinaria de glucosa y a la diuresis osmótica.

<u>Reacciones adversas:</u>
Frecuentes (>1/100, <1/10): vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas. Infección del tracto urinario.

Poco frecuentes (> 1/1000, < 1/100): Infección por hongos.

INTERVENCIÓN

√ Se le indica que no debe suspender el tratamiento sin recomendación de su médico, ya que podría sufrir una descompensación de la diabetes.

√ Se le comunica que aunque a veces esta situación se soluciona por sí sola, debe valorarlo el médico. Se informó al médico mediante informe escrito vía farmacéutico-paciente-médico.

RESULTADO

√ La paciente regresa a la oficina de farmacia indicándonos la retirada de dapagliflozina (Forxiga).

√ El médico le prescribe otro antidiabético: sitagliptina 50 mg (Xelevia) (1-0-0) cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la dipeptidil-peptidasa 4 (DPP-4).

√ Después de 15 días la paciente refiere que los síntomas han desaparecido.

CONCLUSIONES

√ La Dispensación, como servicio esencial del ejercicio profesional del farmacéutico, permite garantizar el acceso de la población a los medicamentos, ofrecer información suficiente para que los pacientes conozcan la correcta utilización de los mismos, así como evitar y corregir algún problema relacionado con los medicamentos.

√ La implicación activa en la dispensación, obtención de la información del paciente, contribuye a fortalecer la relación paciente-farmacéutico.

SEFAC
Sociedad Española de Farmacia
Clínica, Familiar y Comunitaria