



RAM crónica de retención urinaria por abuso de buscapina en paciente pluripatológica polimedcada

XX

Satué-De Velasco, E^{1,2}.

1 Vicepresidente de SEFAC. 2 Farmacéutico comunitario en Maella (Zaragoza)

PRESENTACION CASO

Mujer 75 años, pluripatológica: diabetes, depresión, vertigo, fibromialgia, ansiedad, gastritis, deficit vit D cursa con retención urinaria importante y tratamiento de 17 medicamentos.

Se le presenta la opción de realizar SPD porque admite ya no controlar como debe tomarse la medicación.

EVALUACION

Al realizar la revisión de farmacoterapia en Sefac Expert antes de iniciar el SPD se detectan varias interacciones y precauciones, siendo la más relevante la contraindicación entre uso de buscapina (1-1-1) que toma para la gastritis y retención urinaria

INTERVENCION

Se le plantea retirar la buscapina una semana y determinar si influye en su retención urinaria. Dado que su gastritis está moderadamente controlada accede. Se pone en comunicación del médico quien también lo considera oportuno.

RESULTADOS

A la semana siguiente expresa que la retención urinaria ha desaparecido por completo y hasta se "queja" de que orina demasiado. A su vez echa en menos la buscapina porque refiere nuevos ataques de gastritis.

Se acuerda con ella y el médico introducir una pastilla de buscapina la hora de comer.

En la semana siguiente refiere que su retención urinaria sigue sin aparecer mientras que tiene un mejor control de la gastritis.

Sigue en seguimiento para detectar cambios en este estado, en particular si sigue necesitando la medicación que toma para la retención urinaria (tamsulosina 0,4)

La paciente hacia uso crónico de un medicamento sin prescripción que le generaba una agudización de un cuadro clínico. El acuerdo terapéutico con la paciente es importante a fin de alcanzar un equilibrio entre sus diferentes problemas de salud por lo que es preciso personalizar el ajuste de dosis.

CONCLUSIONES

La revisión de la farmacoterapia es esencial en la realización del servicio de SPD y en general de los pacientes polimedcados. la experiencia en farmacia comunitaria PAra realizar este proceso fue satisfactorio tanto para la paciente como para el médico implicado

PALABRAS CLAVE

“retención urinaria, contraindicación, butilescopolamina.