FARMACOVIGILANCIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LA COVID-19 EN FARMACIAS COMUNITARIAS V. ELECCIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS

grupo berbés 2000-2022

Rocío Mera-Gallego
Alexandre Piñeiro-Abad
Inés Mera-Gallego
J. Carlos Andrés-Iglesias
José A. Fornos-Pérez
N. Floro Andrés-Rodríguez

Farmacia JC Andrés
Grupo Berbés de Investigación y Docencia

Introducción

En Galicia se administró Vaxzevria® (VZ) como primera dosis de la vacuna frente a Covid-19 a sanitarios y trabajadores esenciales menores de 60 años. Tras la alarma social por problemas de trombosis con trombopenia detectados, la administración sanitaria gallega permitió elegir la vacuna que recibirían como segunda dosis, repitiendo con Vaxzevria® o cambiar a Comirnaty® (CO).

Objetivos

Conocer el número de vacunados que eligen una 2ª dosis diferente, las razones por la que eligieron una u otra y las fuentes de información utilizadas para tomar la decisión.

Material y métodos

Diseño: estudio observacional transversal, en una farmacia comunitaria de Vigo (Pontevedra) tras la administración de la 2ª dosis de vacuna Covid-19 en mayo/junio de 2021.

Sujetos: trabajadores esenciales, vacunados con Vaxzevria®, mayores de edad, que firmaron consentimiento informado.

Variables: demográficas, número de vacunados que eligen una vacuna diferente como 2ª dosis, razones para ello, fuentes de información..

Procedimiento: las preguntas correspondientes a este estudio estaban incluidas en el cuaderno de recogida de datos utilizado en el proyecto FARMACOVIGILANCIA DE LAS VACUNAS COVID-19.

Consideraciones éticas: el estudio del que forma parte recibió informe favorable del Comité Ético de Investigación con Medicamentos de Galicia.

Resultados

Se entrevistó a 28 personas, 17 (60,7%) mujeres, 11 (39,3%) hombres; 19 (67,9%) de ellos eran sanitarios.

4 (14,8%) eligieron recibir como 2ª dosis Comirnaty®, 2 mujeres y 2 hombres. 1 hombre no recibió la 2ª dosis por contagio tras la 1ª. Los demás, 23 (85,2%) no cambiaron.

Razones para repetir vacuna: recomendación de las autoridades sanitarias/instituciones científicas, 13 (54,2%); "por no cambiar", 14 (58,3%); las evidencias científicas, 8 (33,3%). 10 encuestados (41,7%) manifestaron más de un motivo.

Razones para cambiar: recomendación del Ministerio de Sanidad, 1; "la considera más segura" y "la 1ª dosis de Vaxzevria® no le generó anticuerpos", 1; "por curiosidad", 1; coincidencia de horario laboral, 1 (VZ se administraba por la mañana y CO por la tarde).

El paciente cree tener suficiente información para decidir



Fuentes de información para la elección

La elección debe recaer en el paciente



Conclusiones

Pese al reducido tamaño de la muestra, los resultados indican que el número de vacunados en 1ª dosis con Vaxzevria® que eligen la 2ª dosis diferente (Comirnaty®) fue pequeño. Las razones para la elección son poco objetivas. Las principales fuentes de información para tomar la decisión fueron los profesionales sanitarios e Internet.

Palabras clave Vacunas Covid-19; Elección segunda dosis; Motivos.

MADRID2022 Conectados al paciente

SEFAC Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria

X CONGRESO NACIONAL DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
5-7 MAYO
Centro de Convenciones Norte IFEMA