

CRIBADO DE EPOC EN FARMACIA COMUNITARIA MEDIANTE ESPIROMETRÍAS CON INDIVIDUOS SELECCIONADOS POR MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UNA POBLACIÓN RURAL DE ALBACETE

Estudio piloto

GARCÍA MORENO, L. MÍNGUEZ MÍNGUEZ, S. POLO GÓMEZ, M. MARTÍNEZ MORATALLA, J. CASTRO NAVARRO, JL. PALACIOS GONZÁLEZ, E. DUQUE GARCÍA, MS. GARCÍA LOPEZ, MJ.

OBJETIVOS

Primario: estudio observacional y descriptivo de la efectividad de la realización de un cribado de EPOC desde la farmacia comunitaria, mediante espirometrías realizadas por farmacéuticos comunitarios debidamente formados.

Secundario: Involucrar a los pacientes fumadores en el servicio de cesación tabáquica de la farmacia comunitaria, mediante la motivación que proporciona la prueba.

MATERIALES Y MÉTODO

Esquema de trabajo

Participantes:

- Pacientes \geq 45 años.
- Fumadores o exfumadores.
- Sin afección pulmonar.
- Acceden voluntariamente a realizar la prueba.




Método:

- 1.- Realización por parte de los farmacéuticos comunitarios de jornadas formativas en el servicio de neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
- 2.- Selección de los pacientes por parte de los médicos de atención primaria de la localidad de Munera (ALBACETE). Se seleccionan un total de 13 pacientes.
- 4.- Desarrollo de ficha clínica, y de test validados en zona de atención personalizada de la farmacia comunitaria.
- 5.- Realización de la prueba espirométrica.
- 6.- Broncodilatación del paciente para comprobar así, su posible hiperreactividad bronquial.
- 7.- Derivación de los pacientes con alteración pulmonar al Centro de Atención Primaria para valoración.


RESULTADOS

Grado de alteración de la espirometría



Un 15,38 % de los pacientes sufren algún grado de alteración

Pacientes incluidos en programa de cesación tabáquica de la farmacia comunitaria



Un 55,55 % acceden al servicio de cesación tabáquica de la farmacia comunitaria y el 44,44% actualmente no fuman

CONCLUSIONES

- El estudio realizado es un ejemplo de lo importante que es el trabajo de una forma multidisciplinar implicando a todos los agentes sanitarios del área de salud.
- Con los resultados obtenidos podemos concluir que el cribaje de EPOC en la Farmacia Comunitaria resulta realizable y efectivo.
- Somos conscientes de que la muestra debería ser mayor para ser significativa, y será interesante ampliarla en futuros estudios ya que los resultados son tremendamente esperanzadores.