

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE RESULTADOS NEGATIVOS ASOCIADOS AL USO DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES ELECTRÓNICAS EN LA FARMACIA COMUNITARIA.

Luis A. Martínez, Farmacéutico Comunitario. Tiriez, Albacete.
Inés San Clemente, Médico de Atención Primaria. Tiriez, Albacete.

Revisión de prescripciones electrónicas

Enero-Diciembre 2015: 14038 PE
PE de IBP: 1186 (8,4% del total)

Registros tratados en hoja de cálculo

Edad, sexo, PE totales, PE tratamientos crónicos, PS crónicos diagnosticados, polifarmacia, IBP, presentación, cronicidad e indicación del tratamiento

Población

164 pacientes
63% mujeres 37% hombres
Edad media 65,7. Rango: 19-95



Indicación de los tratamientos



Prevención gastrolesión
Sin indicación autorizada
Dispepsia
Hernia hiato



95 tratamientos crónicos



41 no indicados



15 riesgo RNM



Los **tratamientos con omeprazol se cronifican y permanecen activos sin un seguimiento adecuado**

El riesgo de RNM asociado a omeprazol aumenta con la duración y con la polifarmacia asociada

¿Qué fármacos están implicados en riesgo de RNM? ¿A través de qué mecanismos?



Riesgo RNM de inseguridad PRM: interacción

Diseño de esquema base para posteriores intervenciones farmacéuticas



luisantonio.martinez@redfarmas.org

ESTAMOS MÁS CERCA, LLEGAMOS MÁS LEJOS

26 - 28 mayo 2016 | Zaragoza