

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE CELIAQUÍA DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA RESPECTO A OTROS AGENTES SANITARIOS USANDO LOS MISMOS CRITERIOS DE DETERMINACIÓN. Matarranz L; Satué E.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena, que produce en determinados individuos predispuestos genéticamente una lesión severa en la mucosa del intestino delgado.

La padecen tanto niños como los adultos, sin embargo, los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando su diagnóstico y tratamiento.

La epidemiología de la EC está representada por el modelo del iceberg. En los países desarrollados, por cada caso diagnosticado hay de cinco a diez casos que no lo están, normalmente porque las complicaciones son atípicas, mínimas o incluso ausentes.

El diagnóstico se basa en la histopatología de la mucosa intestinal. Los marcadores serológicos antitransglutaminasa tisular (tTGA) tienen utilidad para seleccionar a qué individuos se les debe practicar una biopsia intestinal.

Los tests serológicos pueden destapar de forma eficaz una gran porción del iceberg sumergido, realizándose este screening selectivo a través de agentes sanitarios como el farmacéutico.

OBJETIVO

Evaluación de la eficacia de realizar cribaje de EC por parte del farmacéutico comunitario como agente del ecosistema sanitario, detectando posibles celiaquías ocultas y contribuyendo de esa manera a una mayor calidad de vida de los pacientes afectados.

METODOLOGIA

Análisis del estudio realizado por el grupo de farmacias Sanifarma en España, referido a los últimos diez años, sobre la eficacia del cribaje de celiaquía, mediante detección de anticuerpos IgA específicos contra la TGt, claro indicador de EC, a través de test inmunocromatográfico rápido, junto a previo criterio de inclusión de la población general por sintomatología y/o grupos de riesgo; en relación a la prevalencia de EC en España/Europa según la Face (Federación de asociaciones de celíacos en España).

RESULTADOS


Los resultados observados en el estudio que realizó el grupo de farmacias Sanifarma con Biocard™ Celiac Test y previa entrevista de inclusión del paciente en la realización del test, demuestran la relevancia de realizar cribaje de EC desde la farmacia comunitaria.

Se obtuvo una cifra de (1,6% del total) estando por encima de otros cribados en donde se admite como normal la cifra de 1 positivo por cada 100 determinaciones.

Según la Face, la prevalencia de la EC en España es similar a la del resto de Europa: 1 por cada 100 individuos, siendo la enfermedad crónica gastrointestinal más frecuente, aunque sólo un 5% de los casos están diagnosticados.

CONCLUSIONES

El farmacéutico desde la farmacia comunitaria, está capacitado para contribuir a la detección precoz de EC, realizando un diagnóstico previo que selecciona a qué individuos derivar al digestólogo para practicar una biopsia intestinal, diagnóstico definitivo de la EC.



CAMPAÑA REALIZADA POR GRUPO DE FARMACIAS SANIFARMA

Nº FARMACIAS PARTICIPARON: 43
Nº DETERMINACIONES: 640
Nº TESTS POSITIVOS: 10
RESULTADO: 1,6%

1,6% > 1% VALOR MÍNIMO ADMITIDO EN OTROS CRIBAJES

