

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN SERVICIO DE DOSIFICACIÓN PERSONALIZADA

Morote Rodríguez M J.¹

¹Farmacia Yolanda Galiana Guilabert.

INTRODUCCIÓN

El **SPD** (Sistema personalizado de dosificación), simplifica la toma de medicamentos sólidos por vía oral. En él, se agrupan por tomas personalizadas para cada paciente según su posología. La medicación está claramente diferenciada por tomas, días de la semana y franjas horarias.

Está aconsejado para pacientes con problemas en el proceso de uso de medicamentos como: **polimedicados**, con prescripción de **comprimidos fraccionados, dosis decrecientes, alternadas o irregulares, o con dificultades para cumplir con el tratamiento** por problemas cognitivos o de manipulación...etc.

Es una herramienta muy útil para aumentar la adherencia. Además, a través del SPD se pueden identificar **PRM** (problemas relacionados con la medicación), como: errores de administración, conservación inadecuada, dosis, pauta y/o duración inadecuada, duplicidad de dosis, errores de prescripción, interacciones...etc.

PRESENTACIÓN DEL CASO

- ✓ Paciente en el servicio de SPD de la farmacia.
 - Varón de 67 años.
 - Polimedicado (9 fármacos)
- ✓ Acude a su médico de atención primaria para renovar prescripción crónica de Pantoprazol.
- ✓ Al dispensar se observa un cambio en la prescripción de **Pantoprazol por Omeprazol**.

➤ La **asociación de Sintrom con Omeprazol es potencialmente peligrosa¹**.

- Produce o puede producir interacción farmacocinética.
- Algunos inhibidores de la bomba de protones como Omeprazol, pueden potenciar el efecto anticoagulante de Sintrom.
- No se observa esta interacción en la asociación de Pantoprazol con Sintrom

MEDICACIÓN INCLUIDA EN BLISTER SPD

Atorvastatina 40 mg	0-0-0-1
Pantoprazol 20 mg	1-0-0-0
Astudal 5 mg	1-0-0-0
Openvas 40 mg	1-0-0-0
Ranexa 500 mg	1-0-0-1
Procoralan 5 mg	½ -0-0-½
Adiro 100 mg	0-1-0-0
Komboglyze 2,5/850 mg	1-0-0-1

MEDICACIÓN DISPENSADA FUERA DE BLISTER SPD

Sintrom 1 mg

Tabla 1. Detalle de las prescripciones del paciente

INTERVENCIÓN

- Se envía una hoja de interconsulta al médico de atención primaria.
- Se expone la posible interacción con riesgo de hemorragia para el paciente, que causa o puede causar la asociación de Omeprazol con Sintrom.

RESULTADOS

➤ El médico acepta la intervención y cambia la prescripción de nuevo a Pantoprazol.

CONCLUSIONES

Esta intervención pone de manifiesto la gran importancia de la labor asistencial que se realiza desde la oficina de farmacia, así como el innegable valor y beneficio en salud que representan para la población los servicios profesionales farmacéuticos.



REFERENCIAS

1 – Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios [base de datos en internet]. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS. [Fecha de consulta 18 de marzo de 2018]. [18 pantallas]. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/58994/FT_58994.html