Cuando incumplimiento y dosis inadecuada no son resultados negativos asociados a la medicación

M. Llanos Monteagudo. Farmacéutica comunitaria. Albacete Luis A. Martínez. Farmacéutico comunitario. Tiriez (Albacete)

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer 50 años

Paciente habitual de la farmacia

Revisión del Uso de los Medicamentos

Programa REVISA®




Problemas de salud:

HipercolesterolemiaEpilepsia

Conoce

- > Patologías
- > Tratamientos
 - > Posologías
 - > Dosis

Tratamiento con estatinas



Consulta por mialgia

- Lamotrigina
- 200 mg (1-1-1)
- Simvastatina20 mg (0-0-1)
- •Paracetamol 1 g (a demanda)

REVISIÓN Y EVALUACIÓN

Dosis elevada de Lamotrigina en monoterapia Traga los comprimidos bucodispersables Ok

Incumplimiento total Simvastatina

Toma Pravastatina 20mg

Automedicación Posible interacción

Paracetamol



RESULTADOS

Neurólogo no modifica la dosis dada la estabilidad de la paciente Sin respuesta MAP
La paciente sigue
tomando
Pravastatina

Reducir al mínimo su uso o disminuir dosis 650mg o 500mg



www.congreso-sefac.org