

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

¿SINÓNIMO DE ADMINISTRACIÓN ERRONEA?

Luis A. Martínez
Farmacéutico Comunitario.
Tiríez (Albacete)

M. Llanos Monteagudo
Farmacéutica Comunitaria.
Albacete

Introducción

La alteración y/o el cambio de vía de administración de una forma farmacéutica antes de su uso es una práctica muy habitual y no exenta de riesgo. El farmacéutico, como agente sanitario especialista en el medicamento, es el profesional más capacitado para valorar si se pueden producir RNM.




Objetivos

Valorar la frecuencia con la que la manipulación previa supone la administración errónea. Valorar los RNM detectados.

Métodos

Estudio retrospectivo y observacional. Datos recopilados de servicios profesionales prestados durante 2017: SFT, RUM y dispensación. Análisis estadístico: SPSS 22.0.

Resultados




No hay asociación estadísticamente significativa entre administración errónea y origen de manipulación.

Conclusiones

La modificación de las condiciones de uso no resulta adecuada en un porcentaje notable, incluso si está indicada por el prescriptor

La administración errónea es el origen de un RNM de inseguridad en uno de cada tres casos.



FF	PA	®	
Comprimidos	Acenocumarol	Sintrom	✗
Comprimidos Recubiertos	Bisoprolol	Emconcor cor	✓
Comprimidos efervescentes	Paracetamol	Efferalgan	✗
Comprimidos sublinguales	Buprenorfina Naloxona	Suboxone	✗
Comprimidos bucodispersables	Mirtazapina	Mirtazapina EFG	✗
Parches transdérmicos	Buprenorfina	Feliben	✓
Ampollas	Dexametasona	Fortecortin	✗

FF: forma farmacéutica. PA: principio activo. (R): marca registrada.