1er Congreso Nacional Médico & Farmacéutico
SEMERGEN – SEFAC
N.º 411/126
SEMERGEN Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria AP CNV 00289-2018
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria SEFAC
www.congresosemergen-sefac.com
info@congresosemergen-sefac.com
Madrid
8 y 9 de febrero de 2019
Rafaelhoteles Madrid Norte
#JuntosXsalud

Consulta de indicación farmacéutica sobre eczemas

Criterios de derivación

Vega Calzada, Cristina (1); Palacios Martínez, David (2); Prats Mas, Rosa (3); Eyaralar Riera, Teresa (4); Salar Ibáñez, Luis (5)

1. Farmacéutica comunitaria. Farmacia Ibáñez. Gavà. Barcelona. 2. Médico de Familia. Centro de Salud Isabel II, Parla. Madrid. 3. Farmacéutica comunitaria. Farmacia La Pedrera. Denia. Alicante. 4. Farmacéutica comunitaria. Farmacia Eyaralar. Carbayin Alto. Asturias. 5. Farmacéutico comunitario. Farmacia Salar. Valencia.

Objetivos

Estudiar la demanda de Indicación Farmacéutica relacionada con eczemas.

Metodología

Se consensúan 10 criterios de derivación (CD) con SEMERGEN: situaciones en las que el farmacéutico debe derivar al médico para valoración, aunque se acepta que en algunos casos no se derive al paciente, y/o que el paciente rechace dicha derivación. Los casos se registran en una web habilitada al efecto.

Si se produce la derivación se entrega al paciente un informe para el médico.

Resultados

140 farmacéuticos recogieron 650 casos de consultas por eczema, 58,5% mujeres. El rango de edad fue de 0 a 99 años, siendo el promedio 40,4 años (DE 23,4) 38,4 mujeres, 43,3 hombres. El grupo de edad mas representado fue de 25 a 50 años con el 40,9% de los casos.

375 pacientes presentaban al menos un CD siendo 46 los que presentaban más de 2. No hay diferencias en el número de CD en función de la edad o el sexo.

Todos los pacientes con CD eran susceptibles de ser derivados al médico, pero el farmacéutico decidió no derivar a 40 (10,7%). No hubo diferencias significativas en cuanto a sexo, pero sí en cuanto a la edad. No se propuso derivación a un 7,0% de los que estaban por encima de la mediana de edad (viejos) y a un 14,2% de los que estaban por debajo (jóvenes).

De los 335 a los que se les propuso la derivación, 60 (17,9%) no aceptaron. No hubo diferencias en función del sexo ni de la edad.

EL CD más frecuente fue “Sospecha de lesión cutánea sin diagnóstico” con un 22,6%, seguido de “Extensión de las lesiones” (15,3%).

El primer CD citado fue el que menos se derivó al médico, un 81,1%, y de ellos, un 18,4% rechazaron la derivación. El segundo CD que menos se derivó al médico fue “Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos” (81,4%), y este fue el que más rechazo obtuvo, un 29,8%.

Conclusiones

El programa supone ventajas por la seguridad que aporta. Un 17,9% de los pacientes no aceptaron la derivación.

Palabras clave: indicación farmacéutica, farmacia comunitaria, eczema, dermatología.