

Casos Clínicos

411/24

La importancia de saber llevar bien el ritmo. Know your pulse week.

Autores: Plaza Zamora, J¹; Prats Más, R²; Murillo Fernández, MD³; Tous Trepal, S.⁴


Centro de Trabajo: 1. Farmacéutico comunitario en Javalí Viejo, Murcia; 2. Farmacéutica comunitaria en Denia, Alicante; 3. Farmacéutica comunitaria en Sevilla; 4. Farmacéutico comunitario en Barcelona.

Descripción del caso:

NCB, tiene 71 años y es una paciente habitual de la farmacia comunitaria de Javalí Viejo, diabética e hipertensa, en tratamiento con Empaglifozina 12,5 mg/Metformina 100 mg, Alogliptina 25 mg, Indapamida 2,5 mg, Fenitoína 100 mg y Omeprazol 20 mg. La semana del 19 al 25 de noviembre de 2018 vino a recoger su medicación mensual y le ofrecimos participar en la Semana del Pulso, con el objetivo de detectar a posibles pacientes con fibrilación auricular (FA) no diagnosticada.

Exploración y pruebas complementarias:

Tras la realización de la toma del pulso en la muñeca por palpación del pulso radial detectamos una falta de ritmo con una frecuencia de 134 latidos por minuto, que comprobamos con una prueba posterior con el AliveCor[®] que nos indica que había una posible fibrilación auricular. Le realizamos una toma de presión arterial que nos dio de media 128 mmHg PAS/ 89 mmHg PAD.



Orientación diagnóstica:

Sospechamos que tenía una posible arritmia, con un pulso elevado asintomático, por lo que derivamos al MAP de forma urgente para su evaluación.

Diagnóstico final:

El MAP le realizó un ECG en el que objetivó la FA y remitió al servicio de urgencias del hospital de referencia para su valoración y tratamiento, donde se confirmó el diagnóstico y se le puso como tratamiento bisoprolol 5 mg y enoxaparina 60 mg hasta que acuda la paciente a la consulta de anticoagulación.

Comentario final:

El farmacéutico comunitario puede ayudar a la sensibilización y detección de posibles pacientes con FA.

Bibliografía:

- Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la EACTS Rev Esp Cardiol. 2017;70
Screening for Atrial Fibrillation; A Report of the AF-SCREEN International Collaboration Circulation. 2017;135:1851–1867
Procedimiento normalizado de trabajo del servicio de medición y control de la presión arterial mediante MAFC, AMPA Y MAPA PO/PNT00X/00 realizado por la Comisión de SPF de SEFAC y aprobado el 30-4-2014

Palabras clave:

Fibrilación auricular; cribado; farmacia comunitaria; acv; pulso